令和3年度　回復期リハビリテーション病棟　実績

医療法人　篠田好生会
篠田総合病院　回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟

①疾患別男女別入院人数

(人)

	脳血管系	廃用症候群	整形外科系	合計
男性	124	31	34	189
女性	103	21	83	207
合計	227	52	117	396



②比率

(%)

	脳血管系	廃用症候群	整形外科系	合計	全国平均
男性	31%	8%	9%	48%	42.3%
女性	26%	5%	21%	52%	57.7%
合計	57%	13%	30%	100%	
全国平均	44.7%	8.0%	45.4%		

③疾患別年齢別入院人数

(人)

	脳血管系	廃用症候群	整形外科系	合計	全国平均
45歳未満	4	0	2	6	
45～64歳	19	4	3	26	
65～74歳	46	12	13	71	
75～84歳	73	21	36	130	
85歳以上	85	15	63	163	
平均	78.8	79.5	82.7	79.8	76.9
	73.2	79.8	80.2		



④比率

(%)

	脳血管系	廃用症候群	整形外科系	合計	全国平均
45歳未満	1.0%	0.0%	0.5%	1.5%	2.4%
45～64歳	4.8%	1.0%	0.8%	6.6%	12.9%
65～74歳	11.6%	3.0%	3.3%	17.9%	20.0%
75～84歳	18.4%	5.3%	9.1%	32.8%	33.0%
85歳以上	21.5%	3.8%	15.9%	41.2%	31.7%

⑤年次推移

	脳血管系	廃用症候群	整形外科系	合計
H29年度	226	37	154	417
H30年度	248	28	139	415
R1年度	242	49	85	376
R2年度	244	64	92	400
R3年度	227	52	117	396





⑥疾患別発症～回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟転院までの期間

（日）

	脳血管系	廃用症候群	整形外科系	合計
最大	170	91	152	
最小	6	0	7	
平均	40.1	20.7	32.3	35.2
全国平均	36.0	25.9	23.7	



⑦疾患別回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟の入院期間

	脳血管系	廃用症候群	整形外科系	全体
最大	187	90	90	
最小	8	15	7	
平均	122.0	70.2	47.7	91.0
全国平均	83.1	55.8	55.0	



⑧疾患別BI（100点満点で得点が高いほど自立度が高い）（一般病棟への転棟を除く）

ア）全体

	回ﾘﾊ病棟転棟時BI	回復期退院時BI	改善値
R3（当院）	45.8	71.1	25.3
全国平均	47.5	68.3	20.8
標準偏差	± 27.5	± 30.6	± 18.3
中央値	45	85	25
最大値	100	100	85
最小値	0	0	-30

（H27年度）



イ)脳血管系

	回リハ病棟転棟時BI	回復期退院時BI	改善値	
R3(当院)	43.2	67.0	23.8	
全国平均	43.4	63.2	19.8	(H27年度)
標準偏差	± 30.7	± 34.3	± 19.5	
中央値	45	80	20	
最大値	100	100	85	
最小値	0	0	-30	



ウ)廃用症候群

	回リハ病棟転棟時BI	回復期退院時BI	改善値	
R3(当院)	44.0	68.6	24.6	
全国平均	38.1	54.5	16.4	(H27年度)
標準偏差	± 25.6	± 29.3	± 16.1	
中央値	48	75	25	
最大値	90	100	60	
最小値	0	0	0	



エ)整形外科系

	回リハ病棟転棟時BI	回復期退院時BI	改善値	
R3(当院)	50.9	78.9	28.0	
全国平均	53.1	75.9	22.8	(H27年度)
標準偏差	± 21.5	± 22	± 16.9	
中央値	50	85	25	
最大値	95	100	80	
最小値	5	0	-25	



⑧―2　改善値比較（BI）



⑨疾患別FIM（126点満点で得点が高いほど自立度が高い）（一般病棟への転棟を除く）

ア）全体

	回リハ病棟転棟時FIM	回復期退院時FIM	改善値
R3（当院）	69.1	91.4	22.3
全国平均	65.3	89.8	24.5
標準偏差	± 27.9	± 31.8	± 15.6
中央値	70	98	21
最大値	124	126	75
最小値	18	18	-25



イ）脳血管系

	回リハ病棟転棟時FIM	回復期退院時FIM	改善値
R3（当院）	65.2	87.4	22.2
全国平均	59.5	83.9	24.4
標準偏差	± 29.9	± 34.5	± 16.8
中央値	65	97	21
最大値	124	126	69
最小値	18	18	-17



ウ)廃用症候群

	回リハ病棟転棟時FIM	回復期退院時FIM	改善値
R3(当院)	66.8	87.1	20.3
全国平均	58.4	79.3	20.9
標準偏差	± 26.7	± 31.6	± 13.8
中央値	68.5	91.0	21
最大値	122	126	44
最小値	18	18	-4



エ)整形外科系

	回リハ病棟転棟時FIM	回復期退院時FIM	改善値
R3(当院)	76.5	99.8	23.3
全国平均	71.4	96.7	25.3
標準偏差	± 23.1	± 25	± 14.3
中央値	77.0	105.5	22
最大値	121	126	75
最小値	24	18	-25



⑨—2 改善値比較(FIM)



⑩食事摂取経路比較（入院時、退院時）（一般病棟への転棟を除く）

			退院時		
			経口	経管	胃瘻
入院時	経口	316	314	2	0
	経管	21	11	9	1
	胃瘻	8	2	0	6
			327	11	7







⑪疾患別退院先別件数

	脳血管系	廃用症候群	整形外科系	合計 (人)	率 (%)	全国平均
自宅	101	31	80	212	**61.4%**	66.5%
介護老人保健施設	13	5	10	28	8.1%	6.7%
特別養護老人ホーム	21	5	2	28	8.1%	3.1%
有料老人ホーム等	29	3	14	46	13.3%	8.6%
グループホーム	5	0	2	7	2.0%	
療養病棟	11	2	1	14	4.1%	0.9%
他医療機関	7	0	3	10	2.9%	3.1%
合計	**187**	**46**	**112**	**345**	**100.0%**	





※全国平均 ： 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟の現状と課題に関する調査報告書 2021年2月（一般社団法人 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟協会）